

For the use of Registered Medical Practitioner
or a Hospital or a Laboratory only.

Cyproheptadine hydrochloride, Peptone, Lysine hydrochloride Syrup

DESYREL®

SYRUP

COMPOSITION:

Each 5 ml contains :
Cyproheptadine Hydrochloride BP 2 mg
Peptone 25 mg
Lysine Hydrochloride BP 150 mg
in a flavoured syrupy base.
Colour: Approved colour used

Category: Appetite stimulant

 **Pharmaceutical Dosage Form:** Syrup

 **Route of Administration:** Oral

Dose : Adults: 2 teaspoonsful (10 ml), before breakfast, lunch & dinner.

Do not exceed 3 times a day.

Children 7 to 12 years: 1 teaspoonful (5 ml), before breakfast, lunch & dinner.

Do not exceed 3 times a day.

Children - 2 to 7 years old: ½ teaspoon (2.5 ml), before breakfast, lunch & dinner.

Do not exceed 3 times a day.

Infants - below 2 years: To be administered only on advise of physician
Or as directed by the physician.

 **Pharmacokinetics**
Absorption

Oral rapidly absorbed from gastro- Intestinal tract.

Metabolism

Hepatic; some renal

Excretion

Via the urine as metabolites and unchanged drug. Some excretion in the faeces.

Duration of action : 8 hours

 **INDICATIONS**
Loss of appetite.

 **CONTRAINDICATIONS**
It is contra-indicated in pregnancy, and in persons with hypersensitivity to any of the components.

 **WARNING:**
Cyproheptadine may cause drowsiness; patients so affected should not drive or operate any machinery. Avoid alcoholic drinks.

PRECAUTIONS:
Use with caution in pregnancy and in patients intolerant to any of the component of the preparation.

 **ADVERSE REACTIONS / SIDE EFFECTS:**
In rare cases GI Disturbances such as nausea, vomiting and diarrhoea.

 **OVERDOSAGE AND TREATMENT**
OVERDOSAGE:

Symptoms:
Prolonged use may lead to GI Disturbances such as nausea, vomiting and diarrhoea.

Treatment:
Since there is no specific antidote, treatment of overdose should be symptomatic and supportive.

 **STORAGE INSTRUCTIONS**
Store below 30°C.

Protect from light.
Keep out of reach of childrens.

GENERIC HEALTHCARE PVT. LTD.
29A, Shivaji Nagar, Pune-411005.
INDIA
export@ghpl.co
© Trade mark.

16/0699

Pour l'usage des médecins, hôpitaux et
laboratoires seulement

Chlorhydrate de Cyproheptadine, Peptone, Sirop de chlorhydrate de lysine

DESYREL®

SIROP

COMPOSITION:

Chaque 5 ml contient:
Chlorhydrate de Cyproheptadine BP 2 mg
Peptone 25 mg
Chlorhydrate de lysine BP 150 mg
dans une base de sirop aromatisé.
Colorant : Colorant utilisé approuvé

Catégorie: Stimulant de l'appétit

 **Forme pharmaceutique:** Sirop

 **Voie d'administration:** Orale

Posologie: Adultes: 2 cuillerées à café (10 ml), avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Ne pas dépasser 3 fois par jour.

Enfants de 7 à 12 ans: 1 cuillerée à café (5 ml), avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Ne pas dépasser 3 fois par jour.

Enfants - de 2 à 7 ans: ½ cuillère à café (2,5 ml), avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Ne pas dépasser 3 fois par jour.

Enfants - de moins de 2 ans: A administrer seulement sur le conseil d'un médecin
Ou selon les directives du médecin.

 **Pharmacocinétique**
Absorption

Orale, rapidement absorbé par le tractus gastro-intestinal.

Métabolisme

Hépatique; rénal en partie

Excrétion

Par l'urine sous forme de métabolites et de médicament inchangé. Une partie est éliminée dans les selles.
Durée d'action: 8 heures

 **INDICATIONS**
Perte d'appétit.

 **CONTRE-INDICATIONS**
Il est contre-indiqué en cas de grossesse et chez les personnes présentant une hypersensibilité à l'un des composants.

MISE EN GARDE:
La cyproheptadine peut provoquer de la somnolence; les patients ainsi affectés ne devraient pas conduire ou utiliser une machine. Évitez les boissons alcooliques

 **PRÉCAUTIONS:**
À administrer avec prudence en cas de grossesse et chez les patients présentant une hypersensibilité à l'un des composants.

 **EFFETS INDÉSIRABLES/EFFETS SECONDAIRES:**
Dans de rares cas, des perturbations gastro-intestinales telles que des nausées, des vomissements et de la diarrhée ont été notés.

 **SURDOSAGE ET TRAITEMENT EN CAS DE SURDOSAGE:**

Symptômes:
L'administration prolongée peut conduire à des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, des vomissements et de la diarrhée.

Traitement:
Puisqu'il n'y a pas d'antidote spécifique, le traitement du surdosage doit être symptomatique et de soutien.

 **INSTRUCTIONS DE CONSERVATION**
Stocker à une température inférieure à 30°C.
Protéger de la lumière.
Tenir hors de la portée des enfants

GENERIC HEALTHCARE PVT. LTD.
29A, Shivaji Nagar, Pune-411005.
INDIA
export@ghpl.co
© Marque déposée

16/0699