

GENSIL®

Sirop Pour la toux
Liquide pour usage oral

COMPOSITION:

Chaque 5 ml contient des extraits liquides aqueux de:

Feuilles de Justice adatody (Adhatoda vasica)	5 mg
Fruits de poivre long (Piper longum)	25 mg
Fruits de poivre noir (Piper nigrum)	20 mg
Rhizomes de gingembre médicinal(Zingiber officinale)	12 mg
Racine de Solodki (Glycerrhiza glabra)	10 mg
Fruits d'amalaki médicinal (Embllica officinale)	16 mg
Rhizomes de curcuma long (Curcuma longa)	15 mg
Écorce d'Acacia catechu (Acacia catechu)	17 mg
Fruit du fenouil commun(Foeniculum vulgare)	18 mg
Feuilles, racines, graines de basilic sacré (Ocimum sanctum)	5 mg
Fruits de Terminalia chebula (Terminalia chebula)	5 mg
Fruits de Terminalia bellerica (Terminalia bellerica)	5 mg
Rhizomes de Kalgana chinois (Alpinia galama)	20 mg
Feuilles, graines d'abrus prékatorius (Abrus precatorius)	20 mg
Menthol (Menthol)	2 mg
Base de sirop	q.s.
Parahydroxybenzoate de méthyl sodique (comme conservateur)	
Parahydroxybenzoate de propyl sodique (comme conservateur)	

CATÉGORIE: Expectorant, anti-inflammatoire et mucolytique

FORME POSOLOGIQUE PHARMACEUTIQUE : Solution orale liquide

VOIE D'ADMINISTRATION : Orale

POSOLOGIE:

Enfant 1 an à 5 ans : 2.5 ml 2 fois par jour
Enfant 6 ans à 12 ans : 5 ml 2 fois par jour
Enfant plus 12 ans et Adulte : 10 ml 2 à 3 fois par jour

PHARMACOCINÉTIQUE :

En raison du fait que l'absorption systémique du médicament "GENSIL" est faible et comprend de multiples composants, les données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques ne sont pas représentées.

Propriétés/Effets

"GENSIL" a une action expectorante, anti-inflammatoire et mucolytique.

INDICATIONS :

Il est recommandé d'utiliser "GENSIL" pour les affections suivantes:
Mal de gorge / rhume / toux / congestion thoracique lors de bronchites et autres troubles respiratoires associés.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser "GENSIL":
- en cas de sensibilité individuelle élevée au médicament;
- chez les enfants de moins de 1 an.

EFFETS SECONDAIRES :

En cas de réaction allergique, arrêtez de prendre GENSIL et consultez votre médecin.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Il n'est pas recommandé de consommer GENSIL simultanément avec un autre antitussif.

SURDOSAGE :

Il n'y a pas de données spécifiques concernant le surdosage de "GENSIL".

INSTRUCTIONS DE CONSERVATION :

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Conserver dans un endroit sec à l'abri des rayons directs du soleil à une température ne dépassant pas 25°C.

DERNIERE DATE DE RÉVISION: 09/2022

GENERIC HEALTHCARE PVT. LTD.
29A, Shivaji Nagar, Pune-411005.
INDIA
export@ghpl.co
© Marque déposée

16/0480

GENSIL®

Cough Syrup
Liquid for oral use

COMPOSITION:

Each 5 ml contains aqueous liquid extracts of:

Leaves of Justice adatody (Adhatoda vasica)	5 mg
Fruits of long pepper (Piper longum)	25 mg
Fruits of black pepper (Piper nigrum)	20 mg
Rhizomes of medicinal ginger (Zingiber officinale)	12 mg
Root Solodki (Glycerrhiza glabra)	10 mg
Fruits of medicinal embliki (Embllica officinale)	16 mg
Rhizomes of long turmeric (Curcuma longa)	15 mg
Bark of Acacia catechu (Acacia catechu)	17 mg
Fruit of the common fennel (Foeniculum vulgare)	18 mg
Leaves, roots, seeds of holy basi (Ocimum sanctum)	5 mg
Fruits of Terminalia chebula (Terminalia chebula).....	5 mg
Fruits of Terminalia bellerica (Terminalia bellerica)	5 mg
Rhizomes of Chinese Kalgana (Alpinia galama)	20 mg
Leaves, seeds of abrasive prekatorious (Abrus precatorius).....	20 mg
Menthol (Menthol)	2 mg
Syrup base	q.s.
Sodium methyl paraben (As Preservative)	
Sodium propyl paraben (As Preservative)	

CATEGORY: Expectorant, anti-inflammatory and Mucolytic

PHARMACEUTICAL DOSAGE FORM: Liquid oral Solution

ROUTE OF ADMINISTRATION: Oral

DOSE:

Child 1 year to 5 years: 2.5 ml twice a day
Child 6 to 12 years old: 5 ml twice a day
Child over 12 and Adult: 10 ml 2 to 3 times a day

PHARMACOKINETICS:

Due to the fact that the drug "GENSIL" have a low systemic absorption and are multicomponent data of pharmacokinetics and pharmacodynamics is not represented.

Properties/Effects

The drug "GENSIL" has expectorant, anti-inflammatory and mucolytic action.

INDICATIONS

It is recommended to use "GENSIL" for:
Sore throat / Cold / Cough / Chest congestion in bronchitis and other allied respiratory disorders.

CONTRAINDICATIONS :

Do not use "GENSIL":
- At elevated individual sensitivity to the drug;
- children under 1 year.

SIDE-EFFECTS :

In case of any Allergic reaction, please stop consuming GENSIL and consult your Physician.

DRUG INTERACTIONS :

It is not recommended to consume GENSIL simultaneously with any other antitussive.

OVER DOSAGE :

There is no Specific Data for the overdose of "GENSIL".

STORAGE INSTRUCTIONS :

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Store in a dry place away from direct sunlight, temperature not exceeding 25°C.

LAST REVISION DATE: 09/2022

GENERIC HEALTHCARE PVT. LTD.
29A, Shivaji Nagar, Pune-411005.
INDIA
export@ghpl.co
© Trade mark

16/0480